

# CONGRÈS FRANÇAIS DE PSYCHIATRIE

1<sup>ÈRE</sup> ÉDITION

● PSYCHIATRIE FRANÇAISE : IDENTITÉ, DIVERSITÉ

NICE ACROPOLIS

2-5 décembre 2009

Contact | Information | Inscriptions :  
CARCO 22, rue du Banquier 75013 Paris France  
Tél : +33 (0)1 55 43 18 18 Fax : +33 (0)1 55 43 18 19 email : [info@congresfrancaispsychiatrie.org](mailto:info@congresfrancaispsychiatrie.org)  
[www.congresfrancaispsychiatrie.org](http://www.congresfrancaispsychiatrie.org)

Pour leur **Retraite**,  
400 000 adhérents  
**NOUS** font confiance.  
Et **VOUS** ?...

## Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique

Depuis 40 ans  
LA RÉFÉRENCE

Pour les agents de l'État, hospitaliers, des collectivités territoriales et des établissements publics, leurs conjoints et les anciens agents, une retraite complémentaire par capitalisation, facultative, entièrement garantie.

Créée par 4 syndicats de la Fonction Publique. Engagements intégralement couverts par les réserves. Affiliation possible à tout âge, à tout moment.

**Déduction fiscale des cotisations\* + régime fiscal exceptionnel pour les rachats\*\***

\* Dans les limites fixées par la loi

\*\* Pour les agents publics en activité

N° Vert 0 800 208 208

12 bis rue de Courcelles 75008 PARIS - Tél. : 01 44 13 64 13 - www.prefon.fr

**PRÉFON**  
L'AUTHENTIQUE SÉCURITÉ

“

Un groupe de collègues, représentant les principaux modes d'exercice de la psychiatrie en France, a souhaité remettre à l'ordre du jour la tenue régulière d'un grand congrès, réunissant toutes les composantes - d'intérêt scientifique ou de référence théorique - de la psychiatrie française.

Ce congrès, qui aura une fréquence annuelle, se réunira à tour de rôle dans quelques grandes villes françaises.

Il aura pour vocation de faire le point sur toute l'actualité scientifique, à l'instar d'autres grands rendez-vous existants dans d'autres pays.

Il constituera un support aux démarches de formation médicale continue.

Il n'aura d'autre objectif économique que de dégager le budget nécessaire à son organisation en redistribuant les éventuels bénéfices aux associations partenaires pour promouvoir l'enseignement et la recherche en psychiatrie.

Ces collègues ont proposé à toutes les bonnes volontés, sans aucune exclusive, de prendre une part active à cette manifestation.

C'est ainsi que nous pouvons vous présenter par ce document la teneur du

## CONGRÈS FRANÇAIS DE PSYCHIATRIE 1<sup>ÈRE</sup> ÉDITION

Bien cordialement vôtres,



Frédéric ROUILLON



Patrice BOYER

”

## Trouble Bipolaire :

Traitement des épisodes maniaques chez les patients souffrant de trouble bipolaire en cas de contre-indication ou d'intolérance au lithium. La poursuite du traitement au décours de l'épisode maniaque peut être envisagée chez les patients ayant répondu en aigu au traitement de cet épisode.

Retrouver l'équilibre



THYMORÉGULATEUR

194360 - 01/07

**Dénominations et composition :** DÉPAKOTE 250 mg, comprimé gastro-résistant, dosé à 269,10 mg de divalproate de sodium, quantité correspondant à acide valproïque 250,00 mg. DÉPAKOTE 500 mg, comprimé gastro-résistant, dosé à 538,20 mg de divalproate de sodium, quantité correspondant à acide valproïque 500,00 mg. **Indications :** Chez l'adulte : Traitement des épisodes maniaques chez les patients souffrant de trouble bipolaire en cas de contre-indication ou d'intolérance au lithium. La poursuite du traitement au décours de l'épisode maniaque peut être envisagée chez les patients ayant répondu en aigu au traitement de cet épisode. **Posologie et mode d'administration\* :** Voie orale. Adulte : Posologie initiale recommandée : 750 mg/j en 2 à 3 prises au cours des repas, à augmenter progressivement par paliers tous les jours, voire tous les 2 jours, jusqu'à la dose minimale efficace atteinte en une semaine environ. Posologie quotidienne : 1000 à 2000 mg sans dépasser 2500 mg. C.T.J. : 0,78 € (DÉPAKOTE 250 mg) ; 0,94 à 1,87 € (DÉPAKOTE 500 mg). Surveillance clinique nécessaire lors de la progression posologique. Réévaluation du bénéfice-risque du traitement à réaliser à intervalle régulier. **Précautions d'emploi\* :** Réduire la dose initiale et adapter la posologie en fonction de la réponse clinique. **Contre-indications :** Antécédent d'hypersensibilité au valproate, au divalproate, au valpromide ou à l'un des constituants du médicament. Hépatite aiguë. Hépatite chronique. Antécédent personnel ou familial d'hépatite sévère, notamment médicamenteuse. Porphyrurie hépatique. Association à la méfloquine, au millepertuis. **Mises en garde et précautions particulières d'emploi\* :** Mises en garde : Ne pas associer aux autres médicaments se transformant en acide valproïque (ex. valproate, valpromide). Détection d'un éventuel surdosage par une surveillance clinique (troubles de la conscience). Augmentation progressive de la posologie et surveillance clinique lors de l'adaptation posologique : des cas de coma parfois associés à une hyperammoniémie ont été rapportés, le plus souvent en début de traitement et lors de polythérapie (en particulier psychotropes). Chez l'insuffisant rénal et lors de la prise de certains médicaments : diminution de la posologie. Chez le sujet âgé, en raison du risque d'encéphalopathie, diminution de la dose initiale puis augmentation très progressive en fonction de la réponse clinique et surveillance du risque de survenue de confusion. Hépatopathies : Exceptionnels cas d'atteintes hépatiques d'évolution sévère parfois mortelle. Pancréatite : Exceptionnels cas de pancréatites d'évolution sévère parfois mortelle, quels que soient l'âge et l'ancienneté du traitement. Association déconseillée : Lamotrigine. **Précautions d'emploi :** Bilan hépatique avant, pendant et en fin de traitement. Bilan biologique plus complet si augmentation des transaminases. Bilan hématologique avant, à 15 jours et en fin de traitement, ou si intervention chirurgicale, hématomas, saignements spontanés. Évoquer le diagnostic de pancréatite en cas de syndrome douloureux abdominal aigu ou de manifestations digestives. Si élévation des enzymes pancréatiques, interrompre le traitement. Déconseillé chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique du cycle de l'urée. Évaluer le rapport bénéfice/risque en cas de lupus érythémateux disséminé. Informer le patient du risque de prise de poids et des mesures diététiques à adopter. Instaurer une méthode de contraception efficace avant la mise sous traitement chez la femme en âge de procréer. **Interactions\* :** L'utilisation conjointe de médicaments proconvulsivants ou abaissant le seuil épileptogène (par exemple : antidépresseurs imipraminiques ou inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine ; les neuroleptiques phénothiazines et butyrophénones, la méfloquine, le bupropion, le tramadol) est à prendre en compte, voire est déconseillée ou contre-indiquée, selon la sévérité du risque encouru. **Grossesse et allaitement\* :** Fortement déconseillé tout au long de la grossesse et pendant l'allaitement. Ne peut être maintenu pendant la grossesse qu'en l'absence d'alternative chez les femmes susceptibles d'être enceintes. **Conduite des véhicules et utilisation des machines\* :** Risques de somnolence. **Effets indésirables\* :** Pancréatite exceptionnelle : arrêt du traitement. Hépatopathies : arrêt du traitement. Risque tératogène. Rares syndromes parkinsoniens réversibles. Très rares cas de troubles cognitifs d'installation insidieuse et progressive (pouvant réaliser un tableau complet de syndrome démentiel), réversibles en quelques semaines à quelques mois après l'arrêt du traitement. États confusionnels ou convulsifs (encéphalopathie). Troubles digestifs en début de traitement. Hyperammoniémie isolée et modérée : ne pas interrompre le traitement. Hyperammoniémie avec symptômes neurologiques : investigations complémentaires. Très rares cas d'hyponatrémie. Chute des cheveux, tremblements fins d'attitude, somnolence. Céphalées. Cas peu fréquents d'ataxie. Thrombopénie dose-dépendante. Diminution du fibrinogène ou allongement du temps de saignement. Plus rarement anémie, macrocytose et leucopénie. Pancytopenie exceptionnelle. Réactions cutanées (rashs exanthémateux). Syndrome de Lyell, syndrome de Stevens-Johnson et érythème polymorphe exceptionnels. Exceptionnels cas d'atteinte rénale. Très rares cas d'énurésie et d'incontinence urinaire. Exceptionnelles pertes d'audition. Très rares cas d'œdème périphérique non sévère. Prises de poids : celles-ci étant un facteur de risque de survenue du syndrome des ovaires polykystiques, surveillance attentive du poids. Troubles menstruels. Jaune orangé S (DÉPAKOTE 250 mg), rouge cochenille (DÉPAKOTE 500 mg) : risque de réactions allergiques. **Surdosage\* :** Prise en charge hospitalière. **Propriétés pharmacodynamiques\* :** ANTIÉPILEPTIQUE. THYMORÉGULATEUR (Code ATC : N03AG01). Liste II. **AMM et prix :** DÉPAKOTE 250 mg : 348 762,3 ; 30 comprimés - 7,77 € - Remb. Séc. soc. à 65 % - Collect. 561 893,4 ; 90 comprimés (modèle hospitalier) - Collect. DÉPAKOTE 500 mg : 354 442,7 ; 90 comprimés - 42,11 € - Remb. Séc. soc. à 65 % - Collect. **Exploitant :** sanofi-aventis france, 1-13, boulevard Romain Rolland - 75014 PARIS. Tél. : 01 57 63 23 23. Information médicale et pharmacovigilance : N° vert 0 800 394 000 - Fax : 01 57 62 06 62. \* Pour une information complémentaire, consulter la monographie complète. DATE DE RÉVISION : Janvier 2006/V1.

## COMITÉ D'ORGANISATION

### Présidents :

Frédéric ROUILLON	Paris
Patrice BOYER	Paris

### Membres du Bureau :

Michel BOTBOL	Paris
Jean-Philippe BOULENGER	Montpellier
Philippe CLÉRY-MELIN	Garches
Alain GÉRARD	Paris
Philip GORWOOD	Paris
Antoine GUÉDENEY	Paris
Marie-Christine HARDY-BAYLÉ	Versailles
Denis LEGUAY	Angers
Jean-Pierre LÉPINE	Paris
François PETITJEAN	Paris
Michel REYNAUD	Villejuif

### Membres de droit :

Représentant du CPNLF  
Président de la Fédération Française de Psychiatrie  
Représentant des internes DES de psychiatrie (AFFEP)

## COMITÉ D'ORGANISATION LOCAL

### Président d'Honneur :

Guy DAR COURT

### Président :

Dominique PRINGUEY

### Vice-Président :

Philippe ROBERT

### Secrétaire Général :

Michel BENOIT

### Membres du Bureau :

Faredj CHERIKH  
Jean-Yves GIORDANA  
Frédéric JOVER  
Frantz KOHL  
Jean-Paul ORTH  
François PAPETTI  
Sandrine THAUBY

## COMITÉ NATIONAL

Mocrane ABBAR	Nîmes
Charles ALEZRAH	Thuir
Uttam BARUA	Paris
Thierry BAUBET	Bobigny
Christiane de BEAUREPAIRE	Fresnes
Michel BENOIT	Nice
Rachel BOCHER	Nantes
Pascal CACOT	Paris
Bernard CORDIER	Suresnes
Marc-Antoine CROCQ	Rouffach
Aimé CHARLES-NICOLAS	Fort-de-France
Jean-Pierre CLÉMENT	Limoges
Jean-Pierre DAULOUËDE	Bayonne
Pascal DELAMILLIEURE	Caen
Christian GAY	Garches
Elisabeth GIRAUD-BARO	Saint-Egrève
Yvan HALIMI	La Roche-sur-Yon
Nora HAMDANI	Créteil
Patrick HARDY	Le Kremlin-Bicêtre
Jean-Michel HAVET	Reims
Maria ILIOPOULOS	Colombes
Serge KANNAS	Paris
Bernard LACHAUX	Villejuif
Béatrice LAFFY-BEAUFILS	Paris
Olivier LEHEMBRE	Valenciennes
Denis MAQUET	Paris
Jean NAUDIN	Marseille
Annie NAVARRE-COULAUD	Dieppe
Jean-Paul ORTH	Nice
Jean-Claude PENOCHET	Montpellier
Nathalie PRIETO	Lyon
Philippe RAYMONDET	Toulon
Christophe RECASENS	Saint-Maur-des-Fossés
Jean-Louis SENON	Poitiers
Franck SCHURHOFF	Créteil
Norbert SKURNIK	Paris
Christian SPADONE	Paris
Olivier TAÏEB	Bobigny
Marie-Noëlle VACHERON	Paris
Gilles VIDON	Saint-Maurice
Lionel WAINTRAUB	Paris
Daniel ZAGURY	Ville-Evrard

## COORDONNATEURS RÉGIONAUX

● Est	
Jean-Marie DANION	Strasbourg
Jean-Pierre KAHN	Toul
Michel PATRIS	Strasbourg
Gérard SCHMIT	Reims
● Ile de France	
Franck BELLIVIER	Créteil
David COHEN	Paris
Philippe FOSSATI	Paris
Jean-Charles PASCAL	Suresnes
● Nord	
Jean-Yves ALEXANDRE	Roubaix
Pierre THOMAS	Lille
Guillaume VAÏVA	Lille
● Ouest	
Patrick DELBROUCK	Saint-Nazaire
Sonia DOLLFUS	Caen
Pascale JOLLIET	Nantes
Jean-Luc VÉNISSE	Nantes
● PACA	
Jean-Michel AZORIN	Marseille
Thierry BOTTAÏ	Martignes
Philippe ROBERT	Nice
● Rhône-Alpes	
Thierry d'AMATO	Lyon
Thierry BOUGEROL	Grenoble
Jean-Paul CHABANNES	Saint-Egrève
● Sud	
Charles ALEZRAH	Thuir
Jean-Philippe BOULENGER	Montpellier
Jean-François CHIARINY	Montpellier
Michèle MAURY	Montpellier
● Sud-Ouest	
Manuel BOUVARD	Bordeaux
Jean-Pierre CLÉMENT	Limoges
Michel FARUCH	Toulouse
Laurent SCHMITT	Toulouse
Hélène VERDOUX	Bordeaux

## COMITÉ SCIENTIFIQUE

Lucien ABENHAIM	Paris
Jean-François ALLILAIRE	Paris
Henri-Jean AUBIN	Villejuif
Marc AURIACOMBE	Bordeaux
Daniel BAILLY	Marseille
Renaud de BEAUREPAIRE	Villejuif
Rachid BENNEGADI	Paris
Amine BENYAMINA	Villejuif
Olivier BLIN	Marseille
Alain BRACONNIER	Paris
Silla CONSOLI	Paris
Maurice CORCOS	Paris
Philippe COURTET	Montpellier
François-Régis COUSIN	Saint-Germain-en-Laye
Emmanuelle CORRUBLE	Le Kremlin-Bicêtre
Henry CUCHE	Garches
William DAB	Paris
Roland DARDENNES	Paris
Bruno FALISSARD	Paris
Françoise GOROG	Paris
Julien-Daniel GUELF	Paris
Michel HAMON	Paris
Roland JOUVENT	Paris
Christophe LANÇON	Marseille
Marion LEBOYER	Créteil
Yves LECRUBIER	Paris
Michel LEJOYEUX	Paris
Philippe LESIEUR	Paris
Frédéric LIMOSIN	Reims
Pierre-Michel LLORCA	Clermont-Ferrand
Luc MALLET	Paris
Patrick MARTIN	Paris
Jean-Albert MEYNARD	La Rochelle
Jean-Paul MIALET	Paris
Bruno MILLET	Rennes
Christine MIRABEL-SARRON	Paris
Marie-Rose MORO	Paris
Marie-Christine MOUREN	Paris
Bernard ODIER	Paris
Antoine PELISSOLO	Paris
François POINSO	Marseille
Dominique PRINGUEY	Nice
Jean-Luc ROELANDT	Lille
Jean-Claude SAMUELIAN	Marseille
Jean-Louis TERRA	Lyon-Bron
Florence THIBAUT	Rouen
Michel WALTER	Brest

## COMITÉ DE PARRAINAGE INTERNATIONAL

Hans ÅGREN	Stockholm, Suède
Marc ANSSEAU	Liège, Belgique
Charles BADDOURA	Beyrouth, Liban
Béchir BEN HADJ ALI	Sousse, Tunisie
Jean-Claude BISSERBE	Ottawa, Canada
Pierre BLIER	Ottawa, Canada
Riadh BOUZID	Nabeul, Tunisie
Jacques BRADWEJN	Ottawa, Canada
Luis CABALLERO	Madrid, Espagne
Kolou DASSA	Lomé, Togo
Koen DEMYTTENAERE	Louvain, Belgique
Saïda DOUKI-DEDIEU	Tunis, Tunisie
François FERRERO	Genève, Suisse
Martine FLAMENT	Ottawa, Canada
Prosper GANDAHO	Parakou, Bénin
Guy GOODWIN	Oxford, Royaume-Uni
Patrick Mc GORRY	Melbourne, Australie
Momar GUËYE	Dakar, Sénégal
Jean-Marc GUILÉ	Montréal, Canada
Ulrich HEGERL	Leipzig, Allemagne
Luigi JANIRI	Rome, Italie
Farid KACHA	Alger, Algérie
Nadia KADRI	Casablanca, Maroc
David KINGDON	Southampton, Royaume-Uni
Drissa KONÉ	Abidjan, Côte d'Ivoire
Malcolm LADER	Londres, Royaume-Uni
Pierre LALONDE	Montréal, Canada
Robert LIBERMAN	Los Angeles, États-Unis
Samuel MAMPUNZA	Kinshasa, République Démocratique du Congo
Karl MANN	Mannheim, Allemagne
Mauro MAURI	Pise, Italie
Jose-Manuel MENCHON	Barcelone, Espagne
Angel-Luis MONTEJO	Salamanque, Espagne
Stuart MONTGOMERY	Londres, Royaume-Uni
Alain MOUANGA	Brazzaville, République du Congo
Luc NICOLE	Montréal, Canada
Arouna OUEDRAOGO	Ouagadougou, Burkina-Faso
Charles PULL	Luxembourg, Luxembourg
Bernard RIMÉ	Louvain, Belgique
Thomas SCHLAEPFER	Bonn, Allemagne
Boualem SEMAOUNE	Alger, Algérie
John TALBOTT	Baltimore, États-Unis
Graham THORNICROFT	Londres, Royaume-Uni
Mathieu TOGNIDE	Cotonou, Bénin
Alan WADE	Glasgow, Royaume-Uni
Semir ZEKI	Londres, Royaume-Uni

## ASSOCIATIONS PARTENAIRES

- AFDAS-TCA Association Française pour le Développement des Approches Spécialisées des Troubles du Comportement Alimentaire  
Jean-Luc VÉNISSE
- AFERUP Association Francophone pour l'Étude et la Recherche sur les Urgences Psychiatriques  
Isabelle FERRAND
- AFORCUMP Association de Formation et de Recherche des Cellules d'Urgence Médico-Psychologiques - Société Française de Psychotraumatologie  
Louis JEHEL
- AFP Association Française de Psychiatrie  
Bernard GIBELLO
- AFPB Association Française de Psychiatrie Biologique  
Florence THIBAUT
- AFTAD Association Française des Troubles Anxieux et de la Dépression  
Jean-Philippe BOULENGER
- AFTCC Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive  
Frédéric CHAPELLE
- AIEP Association Internationale d'Ethno-Psychanalyse  
Marie-Rose MORO
- AMRP Association pour la Méthodologie de la Recherche en Psychiatrie  
Patrick HARDY
- ARSPG Association de Recherche et de Soutien de soins en Psychiatrie Générale  
Charles-Siegfried PERETTI
- ASPS Association Scientifique des Psychiatres de Secteur  
Annie CHABAUD
- Association Française et Eugène Minkowski – Centre Minkowska  
Rachid BENNEGADI  
Christophe PARIS
- CCRP Clinique Contemporaine et Recherche en Psychiatrie  
Luc MALLET
- CFRP Comité Français pour la Réhabilitation Psycho-sociale  
Elisabeth GIRAUD-BARO
- CNASM Centre National Audiovisuel en Santé Mentale  
Alain BOUVAREL
- CPNLF Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française  
Jean-Paul CHABANNES
- CRÉA Cercle de Recherche et d'Étude de l'Anxiété  
Dominique SERVANT
- F2RSM Fédération Régionale Nord Pas-de-Calais de Recherche en Santé Mentale  
Pierre THOMAS
- FASM Fédération d'Aide à la Santé Mentale Croix Marine  
Bernard DURAND
- FONDA-MENTALE FONDAtion de recherche et de soins en santé MENTALE  
Marion LEBOYER

- Fondation Santé des Etudiants de France  
Philippe LESIEUR
- FUAG France Université Antidépresseurs : Groupe d'études  
Catherine MASSOUBRE
- GEPS Groupement d'Étude et de Prévention du Suicide  
Jean-Jacques CHAVAGNAT
- GFEP Groupe Français d'Epidémiologie Psychiatrique  
Viviane KOVESS
- SFAP Société Franco-Algérienne de Psychiatrie  
Mohamed TALEB
- SFPEA Société Française de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent  
Claude BURSZTEJN
- SFRP Société Française de Relaxation Psychothérapique  
Philippe NUBUKPO
- SFRSRP Société Française de Recherche sur les Soins de Réadaptation en Psychiatrie  
Pascal CACOT
- SIP Société de l'Information Psychiatrique  
Nicole GARRET-GLOANEC
- SIPE Société Internationale de Psychopathologie de l'Expression et d'art-thérapie  
Laurent SCHMITT
- SMF Société Marcé Francophone  
Nine GLANGEAUD  
Anne-Laure SUTTER
- SMP Société Médico-Psychologique  
Christine MIRABEL-SARRON
- Société de Psychologie Médicale et de Psychiatrie de Liaison  
Jean-Louis TERRA
- SPCDN Société de Phénoménologie Clinique et de Daseinsanalyse de Nice  
Dominique PRINGUEY
- SPLF Société de Psychogériatrie de Langue Française  
Jean-Pierre CLÉMENT
- SPPPM Société de Psychiatrie, de Pédopsychiatrie et de Psychologie de la Méditerranée  
Frédéric JOVER
- SFETD Société Française d'Étude et de Traitement de la Douleur  
Jean BRUXELLE
- WAIMH World Association for Infant Mental Health - section francophone  
Pierre DELION  
Michel DUGNAT
- Avec la participation de  
ASCODOCPSY  
Nathalie BERRIAU  
CCOMS Centre Collaboratif OMS  
Jean-Luc ROELANDT

## ● SÉANCE INAUGURALE

- Identité de la Psychiatrie Française Jacques POSTEL

## ● CONFÉRENCES

1 conférence de 1h00, par demi-journée sur 5 demi-journées de 11h30 à 12h30 et de 13h45 à 14h45.

- Partage social des émotions Bernard RIMÉ
- Cognition, émotion, action : l'anatomie partagée Luc MALLET
- Les neurosciences, la psychanalyse et les psychothérapies Roland JOUVENT
- Mémoire à long terme, émotions et psychopathologie Patrice BOYER
- La neurobiologie de l'amour et de la haine Semir ZEKI

## ● SESSIONS THÉMATIQUES

28 sessions de 1h45  
Sessions en parallèle, par demi-journée sur 5 demi-journées de 9h15 à 11h00 et de 15h00 à 16h45.

Parmi ces thèmes pré-sélectionnés :

- La maladie d'Alzheimer en 2009 : les symptômes psychologiques et comportementaux
- Antipsychotiques et syndrome métabolique
- Actualités psychiatriques en 2009 (nouveaux textes HAS, AFFSAPS,... ; publications marquantes, débats et polémiques, évolution législative)
- Introduction aux neurosciences
- Nouvelles approches des addictions
- Phénoménologie du sujet et de la souffrance
- Psychiatrie et santé mentale
- Retentissement du fonctionnement psychologique des parents sur le développement de la personnalité de l'enfant
- Continuité et/ou discontinuité des troubles mentaux : de l'enfant à l'adulte
- Le concept de psychiatrie périnatale
- Addictions : données nouvelles pour la pratique psychiatrique
- Le secteur, cinquante ans après !
- Actualité sur les troubles de la personnalité
- La prise en charge des phobies en thérapie cognitivo-comportementale
- La prise en charge de l'anorexie mentale aujourd'hui
- Actualités en médecine psychosomatique
- La Modulation Cérébrale Implantée (MCI) dans le traitement des troubles psychiatriques sévères
- Psycho-éducation et observance dans les traitements au long cours
- La santé mentale des étudiants
- Addiction, traumatisme et suicide
- Nouveaux traitements de l'anxiété
- Changer les pratiques psychiatriques pour déstigmatiser les soins et les usagers
- TDHA (de l'enfant à l'adulte) – Évaluation clinique et indications thérapeutiques

- Nouvelles perspectives de traitements des pathologies neuropsychiatriques
- Psychopathologie de l'expression et art-thérapie aux âges de la vie
- Le métier de psychiatre demain (session juniors)
- Nouvelles orientations en psychopharmacologie chez l'enfant et l'adolescent

## ● RENCONTRES AVEC L'EXPERT

14 débats-controverse de 1 heure  
Pré-inscription obligatoire (sans participation financière)  
Débats-controverse, en parallèle, par journée de 8h00 à 9h00.

- Troubles « Border Line »
- Remédiation cognitive et schizophrénie
- TMS répétitive dans le traitement des hallucinations auditives
- Quelle prise en charge, par le secteur pour les schizophrènes résistants ?
- Bonnes pratiques dans la prise en charge psychothérapeutique des migrants et des réfugiés
- Place des psychotropes dans les psychothérapies
- Le transsexualisme aujourd'hui
- Le jeu pathologique
- Facteurs psychiatriques pré-transplantation et pronostic médical des greffes d'organe
- Évaluation du risque de récidive chez les sortants de prison
- Clinique du soin en pédopsychiatrie pour les enfants présentant une dysharmonie évolutive
- Troubles mentaux et situations de grande précarité : quelles réponses ?
- Trouble bipolaire et son spectre
- Révision de la CIM-10 et du DSM-IV : état des lieux

## ● DÉJEUNERS - DÉBAT

8 déjeuners-débat de 1 heure  
Inscription en option (avec participation financière)  
4 déjeuners-débat en parallèle, jeudi et vendredi, de 12h30 à 13h30

- Suicide et antidépresseurs chez l'adolescent : quelles recommandations ?
- Architecture et psychiatrie
- Évolution réglementaire de la recherche clinique, quelle incidence pour la psychiatrie et l'éthique ?
- Prise en compte des facteurs linguistiques et culturels en clinique de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte ?
- Psychiatrie à la personne, une nouvelle éthique du soin en psychiatrie ?
- Les troubles des conduites, réalité clinique ou construction théorique ?
- L'évolution du droit de la santé en psychiatrie : progrès ou régression
- Évaluer la dangerosité

## ● SESSIONS POSTERS

Pendant toute la durée du congrès, sessions de posters, commentées ou libres

## MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2009

Horaires	Amphi ATHENA	Amphi HERMES	Salle RISSO 6	Salle RISSO 7	Salle GALLIENI AB	Salle GALLIENI 3
14h00 15h30		Symposia satellites	Colloque association	Colloque association	Colloque association	Colloque association
15h30 17h00			Colloque association	Colloque association	Colloque association	Colloque association
17h00 18h30			Colloque association	Colloque association	Colloque association	Colloque association
18h30 20h00	Séance inaugurale					

## JEUDI 3 DÉCEMBRE 2009

Horaires	Amphi ATHENA	Amphi HERMES	Salle RISSO 6	Salle RISSO 7	Salle GALLIENI AB	Salle GALLIENI 3
8 h 00 9 h 00			Rencontre avec l'expert	Rencontre avec l'expert	Rencontre avec l'expert	Rencontre avec l'expert
9 h 15 11 h 00		Session thématique	Session thématique	Session thématique	Session thématique	Session thématique
11 h 30 12 h 30	Conférence					
12 h 30 13 h 30			Déjeuner débat	Déjeuner débat	Déjeuner débat	Déjeuner débat
13 h 45 14 h 45	Conférence					
15 h 00 16 h 45		Session thématique	Session thématique	Session thématique	Session thématique	Session thématique
17 h 00 18 h 30	Symposia satellites					

## VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2009

Horaires	Amphi ATHENA	Amphi HERMES	Salle RISSO 6	Salle RISSO 7	Salle GALLIENI AB	Salle GALLIENI 3
8 h 00 9 h 00			Rencontre avec l'expert	Rencontre avec l'expert	Rencontre avec l'expert	Rencontre avec l'expert
9 h 15 11 h 00		Session thématique	Session thématique	Session thématique	Session thématique	Session thématique
11 h 30 12 h 30	Conférence					
12 h 30 13 h 30			Déjeuner-débat	Déjeuner-débat	Déjeuner-débat	Déjeuner-débat
13 h 45 14 h 45	Conférence					
15 h 00 16 h 45		Session thématique	Session thématique	Session thématique	Session thématique	Session thématique
17 h 00 18 h 30	Symposia satellites					

## SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2009

Horaires	Amphi ATHENA	Amphi HERMES	Salle RISSO 6	Salle RISSO 7	Salle GALLIENI AB	Salle GALLIENI 3
8 h 00 9 h 00			Rencontre avec l'expert	Rencontre avec l'expert	Rencontre avec l'expert	Rencontre avec l'expert
9 h 15 11 h 00		Journée Euro-Méditerranée	Session thématique	Session thématique	Session thématique	Session thématique
11 h 30 12 h 30	Conférence					
12 h 30 13 h 00	Clôture du congrès					
14 h 00 15 h 30			Colloque association	Colloque association	Colloque association	Colloque association
15h30 17h00			Colloque association	Colloque association	Colloque association	Colloque association

## DROITS D'INSCRIPTION

Droits d'inscription préférentiels pour les membres des Sociétés Savantes de psychiatrie et associations partenaires.

	Avant le 31/03/09	Du 01/04/09 au 30/09/09	À partir du 01/10/09
Non-membre	320 €	380 €	470 €
Membre	180 €	210 €	260 €
Étudiant * moins de 28 ans	55 €	75 €	100 €
Déjeuner-débat	20 €	20 €	20 €

\* joindre la copie de la carte d'étudiant 2009

Incluant :

- Accès aux conférences et sessions scientifiques thématiques
- Accès aux rencontres avec l'expert sur pré-inscription (nombre limité)
- Accès aux déjeuners-débat sur inscription payante (nombre limité) - déjeuner servi en plateau-repas-
- Invitation à la cérémonie d'ouverture
- Programme
- Livre des résumés
- Badge
- Certificat de présence
- Dossier congrès

### Modalités d'inscription

Toute inscription doit obligatoirement être accompagnée de son règlement par :

- Chèque à l'ordre de CARCO - CFP 2009
- Carte bancaire : Visa, Mastercard, American Express

Carco enverra une confirmation d'inscription au congrès, aux rencontres avec l'expert et aux déjeuners-débat éventuellement choisis dès réception du bulletin.

La date de clôture des inscriptions est fixée au 16 novembre 2009, après cette date les inscriptions ne pourront être faites que sur place.

### Changement de nom

En cas de modification avant le 2 novembre 2009 aucun frais ne sera retenu et ce pour une seule modification de nom par inscription. En cas contraire, le changement de nom sera considéré comme une annulation entraînant le paiement d'une nouvelle inscription.

### Conditions d'annulations

Seules les annulations parvenant par lettre ou par fax à Carco seront prises en compte.

Frais d'annulation pour une inscription

- Avant le 31.03.09 : remboursement moins 30 € pour frais de dossier
- Entre le 01.04.09 et le 30.09.09 : remboursement de 50 % du montant total
- À partir du 01.10.09 : aucun remboursement
- Déjeuner-débat : aucun remboursement

Le Congrès Français de Psychiatrie 2009 ne peut être tenu responsable de tout problème résultant de grèves, de conditions climatiques ou de tout incident indépendant de sa volonté.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES :

### Lieu :

NICE ACROPOLIS  
1, Esplanade Kennedy 06300 NICE  
Niveau 2 – Espace Rhodes

### Langue : Français

### Secrétariat général et organisation technique :

CARCO  
22, rue du Banquier 75013 PARIS  
Tél : + 33 (0) 1 55 43 18 18  
Fax : + 33 (0) 1 55 43 18 19

### Coordination scientifique :

Nathalie ISABELLE nathalie.isabelle@carco.fr

### Coordination technique et logistique :

Martine CHARLES martine.charles@carco.fr

### Inscriptions :

Didier TIRCO didier.tirco@carco.fr

### Hébergement

Des chambres d'hôtel de différentes catégories, de 2 à 4 étoiles luxe, ont été pré-réservées pour ce congrès, la plupart sont situées à quelques minutes du Centre de Congrès, Acropolis.

Pour plus d'information et réservation, contactez :  
Laurence EYRAUD laurence.eyraud@carco.fr

### Transport

Des fichets congrès Air France et SNCF seront adressés aux inscrits leur permettant d'obtenir certaines réductions de tarif.


**ABILIFY® 5 mg comprimés. ABILIFY® 10 mg comprimés. ABILIFY® 15 mg comprimés. ABILIFY® 10 mg comprimés orodispersibles. ABILIFY® 15 mg comprimés orodispersibles. COMPOSITION** : Abilify 5 mg comprimés : chaque comprimé contient 5 mg d'aripiprazole. Abilify 10 mg comprimés et comprimés orodispersibles : chaque comprimé contient 10 mg d'aripiprazole. Abilify 15 mg comprimés et comprimés orodispersibles : chaque comprimé contient 15 mg d'aripiprazole. Excipients : Comprimé : contient du lactose monohydraté. Comprimé orodispersible : contient de l'aspartam (E951).

**INDICATIONS THERAPEUTIQUES** : ABILIFY est indiqué dans le traitement de la schizophrénie. ABILIFY est indiqué dans le traitement des épisodes maniaques modérés à sévères des troubles bipolaires de type I et dans la prévention de récurrences d'épisodes maniaques chez des patients ayant présenté des épisodes à prédominance maniaque et pour qui les épisodes maniaques ont répondu à un traitement par aripiprazole (cf. rubriques Propriétés pharmacodynamiques et Présentations et numéros d'identification administrative / Remboursement<sup>(\*)</sup>).

**POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION** : Voie orale. **Schizophrénie** : La posologie initiale recommandée pour ABILIFY est de 10 ou 15 mg/jour avec une posologie d'entretien de 15 mg/jour, en une seule prise, pendant ou en dehors des repas. ABILIFY est efficace dans un intervalle de doses allant de 10 à 30 mg/jour, CTJ : 4,04 € - 8,08 €. Une augmentation de l'efficacité pour des doses supérieures à la dose quotidienne recommandée de 15 mg n'a pas été démontrée, toutefois certains patients peuvent bénéficier d'une dose plus élevée. La dose quotidienne maximale ne doit pas dépasser 30 mg. **Episodes maniaques** : La posologie initiale recommandée pour ABILIFY est de 15 mg une fois par jour pendant ou en dehors des repas, en monothérapie ou en association (cf. rubrique Propriétés pharmacodynamiques). Certains patients peuvent recevoir une dose plus élevée. La dose quotidienne maximale ne doit pas dépasser 30 mg. **Prévention des récurrences des épisodes maniaques dans les troubles bipolaires de type I** : Pour la prévention des récurrences d'épisodes maniaques chez des patients traités par aripiprazole, le traitement sera maintenu à la même dose. La posologie quotidienne peut être adaptée, une réduction de dose pourra être considérée en fonction de l'état clinique du patient. **Comprimés orodispersibles** : le comprimé orodispersible doit être placé dans la bouche, sur la langue, où il sera rapidement dissous dans la salive. Il peut être pris avec ou sans liquide. Une fois dans la bouche, il est difficile de retirer intact le comprimé orodispersible. Vous pouvez également dissoudre le comprimé dans l'eau et boire la suspension. Les comprimés orodispersibles peuvent être utilisés comme une alternative aux comprimés chez les patients ayant des difficultés à avaler les comprimés d'ABILIFY. **Enfants et adolescents** : Il n'y a pas d'expérience chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans. **Insuffisants hépatiques** : aucune adaptation posologique n'est requise chez les patients atteints d'une insuffisance hépatique légère à modérée. L'administration doit se faire avec prudence chez les patients atteints d'une insuffisance hépatique sévère. Cependant, la dose quotidienne maximale de 30 mg peut être utilisée avec précaution chez les patients atteints d'une insuffisance hépatique sévère. **Insuffisants rénaux** : aucune adaptation posologique n'est requise. **Patients âgés** : En raison d'une sensibilité plus grande de cette population, une dose initiale plus faible doit être envisagée lorsque des raisons cliniques le justifient. **Sexe** : aucune adaptation posologique. **Fumeurs** : aucune adaptation posologique. Lors de l'administration concomitante d'inhibiteurs puissants du CYP3A4 ou du CYP2D6 avec l'aripiprazole, la dose d'aripiprazole doit être réduite. Lorsque l'inhibiteur du CYP3A4 ou CYP2D6 est arrêté, la dose d'aripiprazole doit alors être augmentée. Lors de l'administration concomitante d'inducteurs du CYP3A4 avec l'aripiprazole, la dose d'aripiprazole doit être augmentée. Lorsque l'inducteur du CYP3A4 est arrêté, la dose d'aripiprazole doit alors être ramenée à la posologie recommandée.

**CONTRE-INDICATIONS** : Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients. **MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI** : Lors d'un traitement antipsychotique, l'amélioration de l'état clinique du patient peut nécessiter plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les patients doivent être étroitement surveillés pendant toute cette période. La survenue d'un comportement suicidaire est inhérente aux psychoses et aux troubles de l'humeur et dans certains cas a été rapportée rapidement après l'initiation ou le changement du traitement antipsychotique, y compris avec un traitement par aripiprazole. Une surveillance rapprochée des patients à haut risque doit accompagner le traitement antipsychotique. **Troubles cardiovasculaires. Troubles de la conduction. Dyskinésie tardive. Syndrome malin des neuroleptiques (SMN). Convulsions. Patients âgés présentant un état psychotique associé à une démence** : ABILIFY n'est pas autorisé dans le traitement des états psychotiques associés à une démence. **Hyperglycémie et diabète. Prise de poids. Dysphagie. Lactose** : Intolérance au galactose, déficit en lactase ou malabsorption du glucose ou du galactose. **Hypersensibilité. Comprimés orodispersibles** : Personnes présentant une phénylcétonurie. **GROSSESSE ET ALLAITEMENT** : Ne doit pas être administré pendant la grossesse, sauf si le bénéfice attendu justifie clairement le risque potentiel pour le fœtus. L'allaitement doit donc être déconseillé aux patientes en cours de traitement par l'aripiprazole. **EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES** : Comme avec d'autres antipsychotiques, les patients doivent être mis en garde quant à l'utilisation de machines, y compris la conduite de véhicules à moteur. **EFFETS INDESIRABLES** : Les effets indésirables suivants ont été rapportés plus fréquemment ( $\geq 1/100$ ) que sous placebo, ou ont été identifiés comme des effets indésirables pouvant être cliniquement significatifs<sup>(\*)</sup> dans les études cliniques avec l'aripiprazole sous forme orale. **Affections cardiaques** : Peu fréquent : tachycardie. **Affections du système nerveux** : Fréquent : troubles extrapyramidaux, akathisie, tremblement, étourdissement, somnolence/sédation, céphalée. **Affections oculaires** : Fréquent : trouble de la vision. **Affections gastro-intestinales** : Fréquent : dyspepsie, vomissements, nausées, constipation, hypersécrétion salivaire. **Affections vasculaires** : Peu fréquent : hypotension orthostatique. **Troubles généraux et anomalies au site d'administration** : Fréquent : fatigue. **Affections psychiatriques** : Fréquent : agitation, insomnie, anxiété. Peu fréquent : dépression\*. **Elévations des CPK généralement transitoires et asymptomatiques. Autres données** : Des effets indésirables connus pour être associés aux traitements antipsychotiques ont également été rapportés au cours du traitement par l'aripiprazole (syndrome malin des neuroleptiques, dyskinésies tardives, convulsions, événements indésirables indésirables cérébrovasculaires et augmentation de la mortalité chez les patients âgés souffrant de démence, hyperglycémie et diabète). **Effets indésirables rapportés après la commercialisation** : Les événements indésirables suivants ont été rapportés après la commercialisation : **Investigations** : augmentation de la créatinine phosphokinase, augmentation de la glycémie, variation de la glycémie, augmentation de l'hémoglobine glycosylée. **Affections cardiaques** : allongement du QT, arythmie ventriculaire, mort subite inexpliquée, arrêt cardiaque, torsades de pointes, bradycardie. **Affections hématologiques et du système lymphatique** : leucopénie, neutropénie, thrombocytopénie. **Affections du système nerveux** : troubles de l'élocution, syndrome malin des neuroleptiques (SMN), grand mal épileptique. **Affection respiratoires, thoraciques et médiastinal** : spasme oropharyngé, spasme laryngé, pneumonie de déglutition. **Affections gastro-intestinales** : pancréatite, augmentation de la salivation, dysphagie, gêne au niveau de l'abdomen, gêne au niveau de l'estomac, diarrhée. **Affections du rein et des voies urinaires** : incontinence urinaire, rétention urinaire. **Affections de la peau et du tissu sous-cutané** : rash, réaction de photosensibilité, alopecie, hyperhidrose. **Affections musculo-squelettiques et systémiques** : rhabdomyolyse, myalgie, raideur. **Affections endocrines** : hyperglycémie, diabète mellitus, diabète acidocétosique, coma diabétique hyperosmolaire. **Troubles du métabolisme et de la nutrition** : prise de poids, perte de poids, anorexie, hyponatrémie. **Affections vasculaires** : syncope, hypertension, événements thromboemboliques. **Troubles généraux et anomalies au site d'administration** : trouble de la régulation de la température (par exemple hypothermie, fièvre), douleur thoracique, œdème périphérique. **Affections du système immunitaire** : réactions allergiques (par exemple réaction anaphylactique, œdème de Quincke comprenant gonflement de la langue, œdème de la langue, œdème de la face, prurit ou urticaire). **Affections hépatobiliaires** : ictère, hépatite, augmentation de l'alanine aminotransférase (ALAT), augmentation de l'aspartate aminotransférase (ASAT), augmentation de la gamma glutamyl transférase (GGT), augmentation des phosphates alcalines. **Affections des organes de reproduction et du sein** : priapisme. **Affections psychiatriques** : agitation, nervosité, tentative de suicide, idées suicidaires, suicide accompli (cf. rubrique Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). **PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES** : Classe pharmacothérapeutique : antipsychotique, code ATC : N05 AX12. Pour les rubriques INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D'INTERACTION, SURDOSAGE, PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES, DONNEES DE SECURITE PRECLINIQUES, PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION : se reporter au Vidal. **PRESENTATIONS ET NUMEROS D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE / REMBOURSEMENT** : Comprimés : Plaquettes thermoformées prédécoupées en dose unitaire. **ABILIFY 5 mg comprimés** : Boîte de 28 comprimés : EU/1/04/276/002 - CIP 364 069-7 : 113,17 € Remb. Sec. Soc 65 %, Agrément Coll. ; **ABILIFY 10 mg comprimés** : Boîte de 28 comprimés : EU/1/04/276/007 - CIP 364 073-4 : 113,17 € Remb. Sec. Soc 65 %, Agrément Coll. ; **ABILIFY 15 mg comprimés** : Boîte de 28 comprimés : EU/1/04/276/012 - CIP 364 078-6 : 113,17 € Remb. Sec. Soc 65 %, Agrément Coll. Comprimés orodispersibles : Plaquettes formées à froid prédécoupées en dose unitaire. **ABILIFY 10 mg comprimés orodispersibles** : Boîte de 28 comprimés : EU/1/04/276/025 - CIP 369 214-5 : 113,17 € Remb. Sec. Soc 65 %, Agrément Coll. ; **ABILIFY 15 mg comprimés orodispersibles** : Boîte de 28 comprimés : EU/1/04/276/028 - CIP 369 217-4 : 113,17 € Remb. Sec. Soc 65 %, Agrément Coll. **CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE** : Liste I. **TITULAIRE DE L'AMM** : Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Hunton House Highbridge Business Park, Oxford Road Uxbridge - Middlesex UB8 1HU - Royaume-Uni. **Représentant local en France** : Bristol-Myers Squibb 3, rue Joseph Monier BP 325 92506 Rueil-Malmaison cedex - Information Médicale et Pharmacovigilance : Tél. : 0810 410 500 - Fax : 0805 405 558 - **DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE** : Avril 2008 (version formes orales).

\* Pour une information complète sur ces rubriques, consulter le Vidal.



**ABILIFY® est indiqué :**

- Dans le traitement de la schizophrénie.
- Dans le traitement des épisodes maniaques modérés à sévères des troubles bipolaires de type I et dans la prévention de récurrences d'épisodes maniaques chez des patients ayant présenté des épisodes à prédominance maniaque et pour qui les épisodes maniaques ont répondu à un traitement par aripiprazole\*.

\* Indication non remboursée à la date du 7 avril 2008.

Aujourd'hui, pour l'avenir

**ABILIFY®**  
(aripiprazole)

# STABLON

Tianeptine

12,5 mg

Épisodes dépressifs majeurs, c'est-à-dire caractérisés

## Pour s'attaquer aux racines de la dépression.



*3 comprimés par jour*



**STABLON 12,5 mg - tianeptine. Composition - présentation :** Boîte de 30 comprimés enrobés, dosés à 12,5 mg de tianeptine (sel de sodium). Excipient à effet notoire : saccharose. **Propriétés :** Antidépresseur. Chez l'animal, la tianeptine augmente l'activité spontanée des cellules pyramidales de l'hippocampe et en accélère la récupération. Chez l'homme, la tianeptine se caractérise par une activité : - sur les troubles de l'humeur ; - sur les plaintes somatiques liées à l'anxiété et aux troubles de l'humeur. La tianeptine est dépourvue d'effet : - sur le sommeil et la vigilance ; - sur le système cholinergique (absence de manifestation anticholinergique). **Indications thérapeutiques :** Épisodes dépressifs majeurs - c'est-à-dire caractérisés. **Contre-indications :** Enfants de moins de 15 ans. Association aux IMAO. Il est nécessaire de laisser un intervalle libre de 2 semaines entre une cure d'IMAO et un traitement par tianeptine. Il suffit d'un intervalle libre de 24 heures pour remplacer la tianeptine par un IMAO. Grossesse, allaitement. **Précautions d'emploi :** Surveillance attentive en début de traitement (risque suicidaire inhérent aux états dépressifs), précaution en cas d'anesthésie, information des conducteurs de machine d'un risque potentiel, réduction progressive de la posologie à l'arrêt du traitement, surveillance attentive des patients en cas d'antécédents de pharmacodépendance ou de dépendance à l'alcool pour éviter l'augmentation de posologie, ne pas dépasser les doses recommandées. **Interactions médicamenteuses :** IMAO, miansérine. **Effets indésirables :** Rares : - gastralgies, douleurs abdominales, bouche sèche, anorexie, nausées, vomissements, constipation, flatulences, - insomnie, somnolence, cauchemars, asthénie, - tachycardie, extrasystoles, précardialgies, - vertiges, céphalées, lipothymies, tremblements, bouffées de chaleur, - gêne respiratoire, boule dans la gorge, - myalgies, lombalgies, - abus, dépendance. **Posologie et mode d'administration :** 3 comprimés par jour, matin, midi et soir. Chez l'alcoolique chronique, cirrhotique ou non, aucune modification posologique n'est nécessaire. Chez les sujets de plus de 70 ans et en cas d'insuffisance rénale, 2 comprimés par jour. CTJ de 0,70 € à 1,04 €. Liste I. AMM : 329.339.1. Prix : 10,37 €. Remb. Séc. soc. 65 %. Collect. Information médicale : **ARDIX Médical** - 27, rue du Pont - 92578 Neuilly sur Seine Cedex. Tél : 01 55 72 60 00. Les Laboratoires Servier - 22, rue Garnier - 92578 Neuilly sur Seine Cedex. Pour plus d'informations se reporter au Vidal.